

تشيريل لورنس، طبيبة بشرية، عضوة في
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال
المديرة الطبية

مكتب الصحة المدرسية
42-09 28th St.
Queens, NY 11101-4132

يوليو 2019

عزيزي الوالد(ة)/ولي(ة) الأمر،

حدثت مدينة نيويورك (New York City) متطلبات التطعيم للسنة الدراسية 2019-2020. ويتضمن هذا الخطاب قائمة بمتطلبات التطعيم الجديدة للمدرسة للسنة الدراسية 2019-2020. قبل بدء السنة الدراسية، يجب أن تقدم دليلاً على تطعيم أطفالك إذا كان أطفالك يواظبون في حضور مركز رعاية الطفل أو في مدرسة.

كل الطلاب بدءاً من رعاية الطفل وحتى الصف 12 يجب أن يستوفوا المتطلبات الخاصة بـ:

- لقاحات الديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTaP)، وفيروس شلل الأطفال، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)، وجديري الماء، وفيروس التهاب الكبد B.

ويجب كذلك على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والمسجلين في مركز رعاية الطفل وصف ما قبل الروضة (pre-K) أن يستوفوا المتطلبات الخاصة بـ:

- لقاح (المستدمية النزلية من النوع) ب (Hib) ولقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV).
- لقاح الأنفلونزا (نزلة البرد)
- يجب أن يتلقى الأطفال لقاح الأنفلونزا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 (الأمثل، عندما يصبح متاحاً في أوائل الخريف).

الأطفال من الصف 6 إلى 12 يجب أن يستوفوا كذلك المتطلبات الخاصة بـ:

- الجرعة المنشطة للتيتانوس والديفتيريا والسعال الديكي (Tdap) ولقاح المكورات السحائية المتقارن (MenACWY).

يرجى مراجعة تاريخ تطعيمات طفلك مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بطفلك. يمكن لمقدم الرعاية أن يبلغك إن كان هناك حاجة لتلقي جرعات إضافية لواحد أو أكثر من اللقاحات حتى يتمكن طفلك من المواظبة على حضور مركز رعاية الطفل أو إلى المدرسة خلال هذا العام.

إن كانت لديك أسئلة بخصوص هذه المتطلبات، يرجى الاتصال بمركز رعاية الطفل أو بالمكتب الإداري بالمدرسة.

تفضل بقبول فائق الاحترام،

تشيريل لورنس، طبيبة بشرية، عضوة في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال
المديرة الطبية
مكتب الصحة المدرسية

هل طفلك مستعد للذهاب إلى أحد مراكز رعاية الطفل أو إلى المدرسة؟ تعرف على اللقاحات المطلوبة في مدينة نيويورك (New York City)

على جميع الطلاب من عمر شهرين إلى 18 عامًا في مدينة نيويورك تلقي التطعيمات التالية لكي يتمكنوا من الذهاب إلى مراكز رعاية الطفل أو إلى المدرسة. راجع ما يحتاجه طفلك من لقاحات بناءً على مستوى صفه الدراسي في هذا العام الدراسي.

الصف 12	الصفوف 6 – 11	صف الروضة – الصف 5	صف ما قبل الروضة [مركز رعاية الطفل، أو برنامج Head Start، أو حضانية، أو برنامج التعليم المبكر (3K)، أو صف ما قبل الروضة (Pre-k)]	التطعيمات
3 جرعات		5 جرعات أو 4 جرعات فقط إن كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت في عمر 4 أعوام أو أكبر أو 3 جرعات فقط إن كان عمر الطفل 7 أعوام أو أكبر وبدأت السلسلة في عمر سنة واحدة أو أكبر	4 جرعات	الديفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTaP)
	جرعة واحدة (1) (في عمر 11 عامًا أو بعد ذلك)			الجرعة المنشطة ضد التيتانوس والديفتيريا والسعال الديكي (Tdap)
3 جرعات	4 جرعات أو 3 جرعات فقط إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في عمر 4 أعوام أو أكبر	4 جرعات أو 3 جرعات فقط إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في عمر 4 أعوام أو أكبر	3 جرعات	شلل الأطفال (لقاح شلل الأطفال المعطل) OPV/(لقاح شلل الأطفال الفموي)
		جرعتان (2)	جرعة واحدة (1)	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)
3 جرعات أو جرعتان (2) من لقاح التهاب الكبد B (Recombivax HB) إن كانت الجرعات قد أعطيت بفاصل 4 شهور على الأقل في الفترة بين 11 و15 عامًا من العمر		3 جرعات	3 جرعات	التهاب الكبد B
جرعة واحدة (1)		جرعتان (2)	جرعة واحدة (1)	جديري الماء (الحماق)
جرعتان (2) أو جرعة واحدة (1) فقط إن كانت الجرعة الأولى قد أعطيت في عمر 16 سنة أو أكبر	الصفوف 7 و8 و9 و10: جرعة واحدة (1)			اللقاح المتقارن ضد المكورات السحائية (MenACWY)
			من جرعة واحدة (1) إلى 4 جرعات بناءً على عمر الطفل والجرعات التي تم تلقيها سابقًا	اللقاح المتقارن ضد المستدمية النزلية من النوع B (Hib)
			من جرعة واحدة (1) إلى 4 جرعات بناءً على عمر الطفل والجرعات التي تم تلقيها سابقًا	اللقاح المتقارن ضد المكورات الرئوية (Pneumococcal conjugate, PCV)
			جرعة واحدة (1)	الأنفلونزا

قد يتفاوت عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها طفلك بناءً على العمر وجرعات اللقاح التي تم تلقيها في السابق. قد يحتاج طفلك إلى لقاحات إضافية أو جرعات إضافية من اللقاح إذا كان مصابًا بحالات صحية معينة. تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أسئلة.

للمزيد من المعلومات، اتصل بالرقم 311 أو قم بزيارة nyc.gov/health وابحث عن "student vaccines" [لقاحات الطالب].